



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ministère de la Santé et de l'Action Sociale




PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME AU SENEGAL

**13^{ème} Réunion RBM
À Kigali (Rwanda)
24 – 26 Septembre 2024**

INTRODUCTION

PRESENTATION DU PAYS

- Extrémité ouest africaine
- **Nord**: République de Mauritanie
- **Ouest** : Océan atlantique
- **Sud** : Guinée Conakry et Guinée Bissau
- **Est** : République du Mali
- Population en 2023: **18 032 473 habitants**
- 14 Directions régionales de la Santé
- 79 districts sanitaires
- Endémicité avec recrudescence saisonnière
- Groupes vulnérables : enfants < 5 ans ; FE
- PHR : transhumants, orpailleurs, *talibés*



POIDS DES STRATES : RÉPARTITION INÉGALE DU PALUDISME 2023

La zone rouge dite de contrôle :


- 23% de la population totale
- 76 % des cas de paludisme,
- 55 % des décès tous âges,
- 66 % des décès chez < 5 ans.

La zone jaune de transmission faible à modérée :

- 22% de la population totale
- 20 % des cas de paludisme,
- 30 % des décès tous âges,
- 25 % des décès chez < 5 ans.

La zone verte de très faible transmission:

- 55% de la population totale
- 4 % des cas de paludisme,
- 15 % des décès tous âges,
- 9 % des décès chez < 5 ans.



Depuis plusieurs années les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou, portent encore l'essentiel de la charge du paludisme.

Analyse globale des décès audités (1/2)

- Au total **84 décès** liés au paludisme ont été notifiés et audités dans les CS et les EPS entre Janvier et Septembre 2022 avec fiches transmises sur les **135** décès extraits du DHIS2, soit **62,96%**
- Parmi ces décès audités, 51 sont de sexe masculin (**59,52%**) et 34 de sexe féminin (**40,48%**) et l'âge varie de **06 mois à 68 ans**.
- La tranche d'âge des **< 5 ans** est représentée par **21 cas** soit **25,00%**; celle de **≥5 ≤14 ans** est représentée par **30 cas** soit **35,71%** et la tranche d'âge **≥ 15 ans** est représentée par **33 cas** soit **39,29%**
- Au total, la tranche d'âge pédiatrique représente **60,71%** du total des décès audités.
- La **durée d'hospitalisation** varie de **10 mn à 14 jours** avec : **06 cas** entre **10 et 46 mn** ; **28** décès entre **01 h 50 et 19h** ; **42** entre **01 et 14 jours** et **03 cas** dont la durée n'est pas déterminée.
- La majorité des décès étaient évitables dans les CS et EPS (47/84) soit **55,95 %**.

Analyse globale des décès audités(2/2)

- **Les causes des décès évitables étaient surtout dues :**
 - ✓ À l'absence de traitement pré transfert ,
 - ✓ au démarrage tardif du traitement à l'Artésunate,
 - ✓ à la prise de traitement traditionnel,
 - ✓ au retard dans la prise en charge des complications (anémie non corrigée, IRA,)
 - ✓ aux analyses non effectuées au niveau de l'EPS
 - ✓ à l'absence de la garde,
 - ✓ à la Centrale d'oxygène non fonctionnelle,
 - ✓ au non-respect des normes de transfert du patient;
 - ✓ à la non disponibilité d'une trousse d'urgence au SAU
 - ✓ aux doses d'Artésunate non adaptées



MERCI DE VOTRE ATTENTION

